



TÌNH HÌNH THUỐC ARV VÀ TẠM NGỪNG CẤP PHÁT THUỐC NHIỀU THÁNG

Cung cấp thông tin cho người bệnh về tình hình thuốc ARV hiện nay

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc cung ứng thuốc ARV đang gặp nhiều khó khăn, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã quyết định tạm ngừng cấp phát thuốc nhiều tháng cho người bệnh ổn định. Trong giai đoạn này, người bệnh cũng có thể được bác sỹ quyết định chuyển sang phác đồ điều trị phù hợp khác.

Tư vấn cụ thể cho người bệnh về phương án điều trị trong thời gian tới

Trong trường hợp tạm ngừng cấp thuốc nhiều tháng, người bệnh cần đến cơ sở điều trị nhiều lần (ảnh hưởng đến công việc, chi phí đi lại và thời gian đến cơ sở y tế, v...v...).

Hãy yêu cầu người bệnh chia sẻ trong giai đoạn này:



- Thu xếp thời gian đến cơ sở điều trị đúng hẹn để được khám và lĩnh thuốc
- Nhờ người thân, bạn bè, nhóm cộng đồng hỗ trợ đến cơ sở điều trị đúng hẹn
- Cung cấp số điện thoại của cơ sở điều trị cho người bệnh để họ liên lạc khi cần được hỗ trợ

Dành cho nhân viên y tế

Trong trường hợp người bệnh được chuyển sang phác đồ điều trị khác, tư vấn cho người bệnh về phác đồ điều trị mới:



- Thuốc vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.
- Thông tin cụ thể về phác đồ điều trị mới (tên thuốc, cách dùng, tác dụng không mong muốn, xử trí ban đầu, v...v...)
- Cung cấp số điện thoại của cơ sở điều trị cho người bệnh để liên lạc khi cần được hỗ trợ

Tìm hiểu các khó khăn của người bệnh khi thay đổi phương án điều trị và xây dựng kế hoạch hỗ trợ người bệnh

Khó khăn

- Hạn chế về phương tiện đi lại
- Đi làm ăn xa
- Quên lịch tái khám và lĩnh thuốc
- Tác dụng phụ của thuốc

Hỗ trợ

- Hỗ trợ từ người bệnh khác/người hỗ trợ điều trị
- Chuyển đến cơ sở điều trị phù hợp nếu NB có nhu cầu
- Đặt lịch hẹn tái khám và lĩnh thuốc trên điện thoại
- Tư vấn/xử trí tác dụng phụ của thuốc
- Liên hệ với cơ sở y tế theo số điện thoại được cung cấp



Nhắc lại thông điệp: **Tuân thủ điều trị là chìa khóa thành công trong điều trị ARV.** Yêu cầu người bệnh duy trì uống thuốc đều đặn hằng ngày để giúp người bệnh khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho bạn tình, bạn chích hoặc con của họ.